

## Nurofen dla dzieci JUNIOR trusk. zaw.100ml



Cena: 26,99 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum

### Opis produktu

#### O produkcie

##### O PRODUKCIE

##### Opis

Nurofen dla dzieci Junior - produkt leczniczy stosowany w leczeniu gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

smak truskawkowy.

##### Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbata 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, aromat truskawkowy 500244E (Glikol propylenowy, kwas askorbowy (E 300), naturalne i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne), woda oczyszczona.

##### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Masa ciała (wiek) Dawka jednorazowa Częstotliwość w ciągu 24 godzin

20 do 29 kg (6-9 lat) 200 mg/5 ml 3 razy

30 do 40 kg (10-12 lat) 300mg/7,5 ml 3 razy

Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka utrzymują się dłużej niż 3 dni lub pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.

#### Działanie

Ibuprofen występujący w leku Nurofen dla dzieci Junior należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków jest przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

#### Wskazania

Nurofen dla dzieci Junior jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ),  
jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ,  
jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia),  
jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,  
jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie,  
jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia,  
jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

#### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

zgaga,  
ból brzucha,  
nudności,  
niestrawność,  
biegunka,  
wymioty,  
wzdęcia,  
zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem,  
równe wysypki skórne,  
zaburzenia widzenia,  
ból głowy,  
zawroty głowy,  
bezsenna noc,  
pobudzenie,  
drażliwość lub zmęczenie.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

szumy uszne,  
zmniejszenie stężenia hemoglobiny,  
zwiększenie stężenia mocznika we krwi,  
zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10000 osób):

zapalenie przełyku,  
niewydolność serca,  
kołatanie serca,  
wysokie ciśnienie krwi,

Częstość nieznana:  
reaktywność dróg oddechowych.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dziecko przebyło ostatnio poważny zabieg chirurgiczny,  
Jeśli dziecko jest odwodnione, ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek u dzieci odwodnionych.  
Jeśli u dziecka występowało lub występuje astma lub choroby alergiczne, które mogą powodować duszność.  
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.  
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

#### Nurofen dla dzieci Junior może wchodzić w interakcje z:

lekami o działaniu przeciwzakrzepowym,  
leki obniżające ciśnienie krwi.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub o masie ciała poniżej 20 kg.

#### Pojemność:

100ml

**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.**

#### Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA  
Wołoska 22  
Warszawa  
CECHY PRODUKTU