

## Tadalafil Mensil tabl.powl. 10 mg 2 tabl.

Cena: 39,99 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	2 tabl.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Tadalafilum

### Opis produktu

#### O produkcie

##### Wskazania

Produkt leczniczy Tadalafil Mensil przeznaczony jest do leczenia zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby lek zadziałał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.

Zaburzenia erekcji (dawniej określane jako impotencja) oznaczają brak możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia, wystarczającej do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Przyczyną zaburzeń erekcji mogą być choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia hormonalne, przyjmowanie określonych leków, stosowanie używek (alkohol, tytoń), stres, a także choroby o podłożu psychologicznym (m.in. zaburzenia depresyjne). Zaburzenia erekcji są ważnym sygnałem, który powinien skłonić pacjenta do zgłoszenia się do lekarza w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i identyfikacji schorzenia leżącego u podstaw problemu. Brak identyfikacji choroby podstawowej nie wyklucza jednak możliwości podjęcia farmakoterapii u pacjentów, u których nie ma przeciwwskazań do jej zastosowania. Tadalafil Mensil zawiera 10 mg substancji czynnej Tadalafil, selektywnego odwracalnego inhibitora specyficznej fosfodiesterazy cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) typu 5 (PDE5). Jeśli stymulacja seksualna spowoduje miejscowe uwolnienie tlenu azotu, zahamowanie aktywności PDE5 poprzez tadalafil prowadzi do zwiększenia stężenia cGMP w ciałach jamistych. Powoduje to relaksację mięśni gładkich i napływ krwi do tkanek członka, doprowadzając do erekcji

##### Skład

Substancją czynną leku jest tadalafil. Każda tabletkę leku zawiera 10 mg tadalafilu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian;

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

#### Przeciwwskazania

Nie wolno stosować produktu Tadalafil Mensil u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna.

Ponadto, stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących grupach pacjentów:

w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu,

pacjenci jednocześnie zażywający organiczne azotany (patrz punkt 4),

pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeżyli zawał mięśnia sercowego lub udar,

pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych,

pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association),

pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym,

pacjenci, którzy utracili wzrok w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5.

pacjenci stosujący jednocześnie leki pobudzające cyklazę guanylową, takie jak riocygua

#### Opakowanie

2 tabletki

#### Producent:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.