

Urgo na Odciski z ASA 12 szt.



Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	12 szt.
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

O produkcie

Opis produktu

Urgo Coricide na odciski to samoprzylepne opatrunki z 40% kwasem salicylowym do leczenia i ochrony twardych oraz miękkich odcisków i nagniotków. Plastry usuwają złuszczoną i zrogowaciałą skórę oraz zabezpieczają przed bolesnym uciskiem dzięki ochronnemu pierścieniowi z kwasem salicylowym.

Opatrunek na odciski Urgo pomagają zlikwidować uczucie bólu oraz nawilża i zmiękcza naskórek. Efekty stosowania opatrunku są już widoczne po 5 dniach od nałożenia plastra.

Zastosowanie

Do stosowania w celu skutecznego leczenia i ochrony twardych oraz miękkich odcisków, modzeli i nagniotków, u dorosłych i dzieci powyżej 3 lat.

Sposób użycia

Aplikować opatrunek codziennie unikając zdrowej tkanki, po namoczeniu nóg w ciepłej wodzie, najlepiej przed snem.

Stosować na odciski maksymalnie 8 dni.

Stosować tylko w obszarze odcisku lub zgrubienia skóry (z uwagi na zawartość kwasu salicylowego, który może uszkodzić zdrową tkankę).

Składniki

Kwas salicylowy: 32 mg; substancje wypełniające: biały wosk pszczeły, glicerydy nasycone poliglikolizowane, krzemionka koloidalna bezwodna, kompleks miedziowy chlorofilu.

Ważne wskazówki

W przypadku pojawienia się bólu przerwać stosowanie.

W przypadku zapalenia tętnic, cukrzycy lub neuropatii, przed zasięgnięciem porady lekarza.

Jeśli pomimo stosowania się do instrukcji opatrunku Urgo na Odciski nie widać poprawy lub też problem nawróci, należy zasięgnąć

porady lekarza. Konieczne może okazać się ustalenie przyczyny i indywidualne potraktowanie problemu (pomiary ortopedyczne, modyfikacja obuwia, itp.).

Podobnie jak w przypadku każdego innego produktu, u niektórych po zastosowaniu mogą wystąpić niekorzystne skutki o różnym nasileniu, podrażnienie skóry, zwłaszcza w przypadku zastosowania na zdrową tkankę, czy też w przypadku alergii. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli po 8 dniach stosowania nie nastąpi poprawa, należy zasięgnąć porady podologa.

Ponowne użycie produktu do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia

Opatrunek nie może być stosowany na odciski zainfekowane; w przypadku uczulenia na salicany lub każdy inny składnik opatrunku.

Nie stosować u dzieci poniżej 16 roku życia.

Zawartość opakowania

12 sztuk

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa