

Voltaren Acti Forte tabl.powl. 25mg 10tabl



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	25 mg
Opakowanie	10 tabl.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Diclofenacum

Opis produktu

O produkcie

Tabletki Voltaren Acti Forte 25 mg, zawierają, jako substancję czynną, diklofenak potasu, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, zmniejsza również gorączkę. Voltaren Acti Forte łagodzi objawy stanu zapalnego takie jak ból i obrzęk poprzez blokowanie syntezy cząsteczek (prostaglandyn) odpowiedzialnych za stan zapalny, ból i gorączkę. Voltaren Acti Forte nie wpływa na przyczyny stanu zapalnego i gorączki.

Wskazania

Ból mięśni,
bóle reumatyczne,
ból głowy,
ból zęba,
ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców),
bóle menstruacyjne.

Dawkowanie

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

Dawka początkowa to 1 tabletkę. Jeśli jest to konieczne, można stosować 1 tabletkę, co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletek w ciągu doby. Tabletkę należy połączyć w całości popijając szklanką wody. W celu osiągnięcia największej skuteczności leku, lek Voltaren Acti Forte powinno się przyjmować przed jedzeniem. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nie należy stosować leku Voltaren Acti Forte przez dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki bez porozumienia z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera
25 mg substancji czynnej diklofenaku potasowego substancje pomocnicze: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana,

karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, magnezu stearynian, sacharoza, talk, powidon, makrogol 8000, celuloza mikrokrystaliczna, barwnik dispersed Red 16158, żelaza tlenek (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Podmiot odpowiedzialny i dystrybutor:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.