

## Voltaren Express Forte kaps. miękkie 0,025g



Cena: 25,99 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,025 g
Opakowanie	20 kaps.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Diclofenac potassium

### Opis produktu

#### O produkcie

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt.

Voltaren Express Forte zawiera jako substancję czynną diklofenak potasowy, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt. - skład

Substancją czynną leku jest diklofenak potasowy. Jedna kapsułka zawiera: 25 mg diklofenaku potasowego. Pozostałe składniki to: makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Skład kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol+1,4-sorbitan z mannitolem), żółcień chiniolinowa 70% (E104).

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt. - sposób użycia

Lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: Początkowo 1 kapsułka. Dawkę można powtórzyć po 4 - 6 godzinach. Nie należy stosować więcej niż 3 kapsułki w ciągu doby.

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W celu osiągnięcia największej skuteczności leku, kapsułek nie należy zażywać podczas lub bezpośrednio po posiłku.

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt. - właściwości

Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, zmniejsza również gorączkę. Voltaren Express Forte łagodzi objawy stanu zapalnego takie jak ból i obrzęk, poprzez blokowanie syntezy cząsteczek odpowiedzialnych za stan zapalny, ból i gorączkę, zwanych prostaglandynami.

Voltaren nie wpływa na przyczyny stanu zapalnego i gorączki.

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt. - wskazania

Voltaren Express Forte stosuje się: w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), w bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu; w leczeniu objawów grypy i przeziębienia (ból ogólny, gorączka), bólu gardła.

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt. - przeciwwskazania

Nie stosować leku Voltaren Express Forte: jeśli pacjent ma alergie na diklofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, stanu zapalnego lub gorączki, takich jak diklofenak, ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy (lek stosowany także w celu zmniejszenia krzepnięcia krwi), jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych, np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego

niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowama zamkniętych naczyń krwionośnych; jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych), jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego, objawiające się obecnością krwi w stolcu lub czarnym zabarwieniem stolca, lub perforację (przedziurawienie) przewodu pokarmowego; jeśli występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby;

Voltaren Express Forte, 25 mg, kapsułki miękkie, 20 szt. - działania niepożądane

Często (występują mniej niż u 1 na 10 osób stosujących lek): ból brzucha, biegunka, nudności, wzdęcia, wymioty, niestrawność, zmniejszony apetyt; ból głowy, zawroty głowy; wysypka.

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1000osób stosujących lek): senność; swędząca wysypka.

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10000 osób stosujących lek): mała ilość białych krwinek, mała ilość czerwonych krwinek; zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, opuchnięty, czerwony bolący język, zaburzenia smaku, skurcze w nadbrzuszu; mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, drżenie; swędzenie i zaczerwienienie skóry, wypadanie włosów; zamazane widzenie, dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu; zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji.

**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.**

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.