

Voltaren MAX żel 0,0232 g/g 50 g (tuba)

Cena: 17,90 PLN



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 0,0232 g/g |
| Opakowanie | 50 g (tuba) |
| Producent | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | Diclofenacum |

Opis produktu

O produkcie

Voltaren Gel Max jest lekiem o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i rozkurczowym do stosowania miejscowego w przypadku urazów, obrażeń, a także pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł mięśni czy stawów. Substancją czynną jest diklofenak, czyli niesteroidowy lek przeciwzapalny, którego działanie przeciwbólowe utrzymuje się nawet 12 godzin.

Charakterystyka żelu Voltaren MAX

Voltaren MAX jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NSAID) i należy do tej samej klasy co leki takie jak ibuprofen, naproksen i aspiryna. Diklofenak łagodzi ból i zmniejsza stan zapalny jak inne leki z grupy NLPZ. Działa poprzez blokowanie produkcji pewnych enzymów w naszym organizmie zwanych COX1 i COX2. Enzymy te są odpowiedzialne za produkcję substancji chemicznych zwanych prostaglandynami, które powodują ból i stan zapalny. Blokując produkcję COX 1 i 2, zmniejsza się produkcję prostaglandyn, co skutkuje zmniejszeniem bólu i łagodzeniem stanu zapalnego.

Diklofenak żel do stosowania miejscowego jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę. Należy uważać, aby żel diklofenakowy nie dostał się w okolice oczu, do nosa lub ust. Dużym atutem produktu jest gładka, gęsta struktura, którą łatwo rozsmarować w miejscu objętym stanem zapalnym, obrzękiem czy bólem.

Kiedy warto zastosować Voltaren MAX?

Voltaren MAX w żelu jest lekiem, który zmniejsza obrzęk (stan zapalny) i ból powstały na skutek obrażeń, czynników chorobotwórczych i upadków. Jest on stosowany w leczeniu bólów, jak również w przypadku problemów ze stawami, mięśniami i kośćmi. Obejmują one:

reumatoidalne zapalenie stawów i zapalenie kości i stawów;

zwichnięcia i naciągnięcia mięśni i więzadeł;

ból pleców;

podagra (dna moczanowa);

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – powoduje ono zapalenie kręgosłupa i innych części ciała.

Voltaren MAX jest dostępny bez recepty, w postaci żelu do stosowania na maksymalnie dwa miejsca w stawie, cztery razy dziennie.

Miejsca te mogą obejmować stopę, kostkę, kolano, dłoń, nadgarstek lub łokieć. Zaleca się stosowanie żelu z diklofenakiem bez recepty o tej samej porze każdego dnia.

Wskazania

Lek stosowany jest w miejscowym leczeniu.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: - pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł mięśni i stawów (np.. Powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), - bólu pleców, - ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat): - ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Skład

100g leku zawiera 2,32g substancji czynnej- diklofenaku dietyloamoniowego oraz substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian parafina ciekła makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dieryloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluern, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 14 lat. Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin.

Należy go stosować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na bolące miejsca.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, - jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (no. Wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych, - w trzecim trymestrze ciąży, - u dzieci poniżej 14 lat.

Opakowanie

50g

Uwagi

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach - pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent i podmiot odpowiedzialny
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
W. Rzymowskiego 53
Warszawa